

Polyversum®

Substanța activă: <i>Pythium oligandrum</i> M1, Concentrație: 1 x 10 ⁶ oospori/g				
Formulare: WP pulbere umectabilă în apă, de culoare albă conținând substanța activă <i>Pythium oligandrum</i> M1 și un suport netoxic				
FRAZE DE PERICOL H 317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. EUH401 - Pentru evitarea riscului pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile pentru utilizare.				
FRAZE DE PRECAUȚIE P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 - Citiți eticheta înainte de utilizare. P305+351+338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți P333+313 - în caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501 - Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.				
FRAZE STANDARD DE PRUDENTĂ SPECIALE (conform Regulamentului nr.547/2011) SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul sau (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri).				
Proprietăți fizico-chimice: Aspect: Pulbere fină albă Miros: Asemănător fungilor Stare fizică: pulbere In apă: Realizează o suspensie: pH: 5,5-7,5 (suspensie apoasă) Solubilitate în apă Insolubil			Indicații de utilizare: Rapiță – Putregaiul negru și Putregaiul alb al tulpinilor Grâu – Fuzarioza la spice Orz – Fuzarioza la spice	
Modul de aplicare				
Cultura	Boala	Doza	Timp de pauză	Observații
Rapiță	Putregaiul negru și Putregaiul alb al tulpinilor	100 g/ha în 300-400 l apă/ha	NA	1) Două tratamente împotriva Putregaiului negru. Primul tratament în stadiul BBCH 12-19 în toamnă sau în primăvară în stadiul BBCH 30 – 40. Al doilea tratament în stadiul BBCH 40-65. 2) Două sau trei tratamente împotriva Putregaiului alb al tulpinilor. Primul în stadiul BBCH 12-19, al doilea în stadiul BBCH 30-65 și al treilea în stadiul BBCH 40-65 . Sau primul în stadiul BBCH 30-40 și al doilea în stadiul BBCH 40-65.
Grâu	Fuzarioză	100 g/ha	NA	2-3 tratamente: în toamnă în stadiul BBCH 13-15 (aparitia frunzelor 2-5), în primăvară în stadiul BBCH 25-37 (de la înfrățit până la stadiul de burduf) și pentru spice în stadiul BBCH 55-65 (de la înspicat 50% până la înflorit 50%)
Orz	Fuzarioză	100 g/ha	NA	2 tratamente: în primăvară în stadiul BBCH 25-37 (de la înfrățit până la stadiul de burduf) și pentru spice în stadiul BBCH 55-65 (de la înspicat 50% până la înflorit 50%)
Sănătatea și siguranța la locul de muncă: A se folosi echipament de protecție la preparare și diluție pentru aplicările foliare Mască de protecție: mască cu filtru (cf. EN 149) sau semi-mască cu filtru (cf. EN 149) Protecție pentru ochi și față: ochelari de protecție sau mască de protecție (cf. EN 166). Protecția corpului: îmbrăcăminte de protecție chimică realizată din material textil (cf. EN 368 EN 369), șorț din PVC sau din țesături cauciucate. Protecția capului: șapcă cu apărătoare sau pălărie Protecția mâinilor: mănuși de protecție (cf. EN 374-1). Protecție picior: cizme de cauciuc sau plastic (cf. EN 346).				
Recomandări și posibile riscuri pentru mediu: Acest produs nu este exclus de la utilizare în zona de protecție de nivel 2 freatic și surse de apă de suprafață. Produsul nu are nevoie de clasificare cu privire la protecția păsărilor, organismelor acvatice, vertebrate terestre, albine, artropode nevizate (în afară de albine), microorganismele macroorganismele din sol și plantelor terestre nevizate.				
Curățarea echipamentelor de tratare, eliminarea ambalajelor: După folosire, echipamentele de tratare se curăță cu apă curată. Apa rezultată poate fi împrăștiată pe terenuri acoperite de vegetație. Eliminarea deșeurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005, privind ambalajele.				
Depozitare: Produsul în ambalajul original, nedeteriorat se păstrează într-un depozit uscat la temperaturi între 2 și 25 °C, dotat cu încuietoare. Este necesară prevenirea intrării în contact cu vaporii de la substanțe chimice și trebuie depozitat separat de pesticide, alte chimicale și substanțe inflamabile.				
Termen de valabilitate: Atunci când este depozitat în mod corespunzător, într-un mediu uscat, termenul de valabilitate al produsului este de doi ani de la data fabricației.				